

Nota Técnica 441540

Data de conclusão: 05/12/2025 12:01:51

Paciente

Idade: 54 anos

Sexo: Feminino

Cidade: Passo Fundo/RS

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Federal

Vara/Serventia: 2º Núcleo de Justiça 4.0 - RS

Tecnologia 441540

CID: C11 - Neoplasia maligna da nasofaringe

Diagnóstico: Neoplasia maligna da nasofaringe (C11)

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: NIVOLUMABE

Via de administração: IV

Posologia: Uso injetável: 1- Nivolumabe 10 mg/ml: Realizar 171 mg de nivolumabe intravenoso a cada duas semanas.

Uso contínuo? -

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Não

Oncológico? Sim

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: NIVOLUMABE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Estão disponíveis pelo SUS tratamentos com quimioterapia citotóxica e cuidados clínicos exclusivos (cuidados paliativos).

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não

Custo da Tecnologia

Tecnologia: NIVOLUMABE

Laboratório: -

Marca Comercial: -

Apresentação: -

Preço de Fábrica: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal

Tecnologia: NIVOLUMABE

Dose Diária Recomendada: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: NIVOLUMABE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O nivolumabe é um anticorpo monoclonal, um tipo de proteína concebida para reconhecer e ligar-se a uma estrutura específica chamada antígeno que se encontra em determinadas células do organismo. O nivolumabe bloqueia a ligação entre a proteína PD-L1 (programmed cell death 1) e seus ligantes, ativando linfócitos T citotóxicos e melhorando a imunidade antitumoral. Por esse motivo, juntamente com o fármaco pembrolizumabe, é denominado como um medicamento imunomodulador do grupo anti-PD-1(12).

A atividade antitumoral do nivolumabe foi avaliada em um estudo multicêntrico, de fase 2, que incluiu 45 pacientes com carcinoma nasofaríngeo recorrente ou metastático, previamente tratados com pelo menos uma linha de quimioterapia à base de platina para doença recidivada, com função orgânica adequada. O desfecho primário deste estudo foi a taxa de resposta objetiva e os desfechos secundários incluíram sobrevida e toxicidade. A taxa de resposta objetiva foi de 20,5% (IC 95%, 9,8 a 35,3). A sobrevida livre de progressão (SLP) mediana foi de 2,8 meses (IC 95%, 1,8 a 7,4 meses) e a taxa de SLP em 1 ano foi de 19,3% (IC 95%, 10,1% a 37,2%). Com relação à toxicidade, 22,2% dos pacientes apresentaram eventos adversos de grau 3 ou superior, dentre eles colite, diarreia, fadiga, aumento dos níveis de aspartato aminotransferase ou alanina aminotransferase, neutropenia, hiponatremia e linfopenia (13).

Estudo aberto, multicêntrico, de fase I/II avaliou 24 pacientes com carcinoma nasofaríngeo recorrente/metastático tratados com nivolumabe em monoterapia ou em terapia combinada (CheckMate 358). Dos 24 pacientes tratados, a mediana de idade foi de 51 anos, 88% eram do sexo masculino e 88% apresentavam tumores EBV+. Com um acompanhamento mediano de 26 semanas (variação: 4–40), a taxa de resposta objetiva foi de 20,8% e pareceu ser maior em pacientes sem terapia prévia para doença recorrente ou metastática. A taxa de controle da doença foi de 45,8%. Respostas foram observadas independentemente do status de PD-L1 ou infecção por EBV. A mediana de SLP foi de 2,4 meses (IC 95%: 1,5, não atingido); a mediana de sobrevida global (SG) não foi atingida (14).

Em 2016 foi publicado o estudo CheckMate 141, um ensaio clínico de fase 3, randomizado, multicêntrico, que comparou a eficácia e segurança do uso de nivolumabe em pacientes com CECP recidivado ou refratário à quimioterapia com base em platina (15). Foram randomizados 361 indivíduos para receber nivolumabe (240 pacientes) ou quimioterapia convencional com metotrexato, docetaxel, cetuximabe (121 pacientes). Sendo um estudo aberto, os investigadores e os participantes tinham conhecimento da atribuição do tratamento. O desfecho primário do estudo foi a sobrevida global (SG) dos pacientes a partir do momento de randomização. A mediana de sobrevida no grupo do nivolumabe foi de 7,5 (IC95% 5.5-9.1) meses comparado a 5,1 (IC95% 4.0-6.0) meses no grupo controle. O grupo da imunoterapia apresentou uma OS de 36% (IC95% 28.5-43.4) em 12 meses, em comparação com 16,6% (IC95% 8.6-26.8) do grupo controle, com diferença estatística ($p=0.01$). Não houve diferença de sobrevida livre de progressão entre os grupos. Em relação à segurança, o grupo de nivolumabe apresentou significativamente menos eventos adversos graves (graus 3 ou 4) em comparação com o grupo de terapia convencional (13,1% e 35,1%, respectivamente). Os eventos adversos mais comuns foram fadiga, náuseas, inapetência e prurido, enquanto os eventos adversos graves incluíram pneumonite, mucosite e linfopenia.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário*	Valor Anual
NIVOLUMABE	40 MG SOL INJ52 CT 1 FA VD INC X 4 ML		R\$ 3.512,11	R\$ 182.629,72
NIVOLUMABE	100 MG SOL INJ26 CT 1 FA VD INC X 10 ML		R\$ 8.780,24	R\$ 228.286,24
Total			R\$ 410.915,96	

* Valor unitário considerado a partir de consulta de preço da tabela CMED. Preço máximo de venda ao governo (PMVG) no Rio Grande do Sul (ICMS 17%). O PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF, $PMVG = PF \cdot (1 - CAP)$. O CAP, regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado nº 15, de 31 de agosto de 2017 - Versão Consolidada ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado CMED nº 5, de 21 de dezembro de 2020, o CAP é de 21,53%. Alguns medicamentos possuem isenção de ICMS para aquisição por órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal, conforme Convênio ICMS nº 87/02, sendo aplicado o benefício quando cabível.

O nivolumabe é produzido pela empresa Bristol-Myers Squibb Farmacêutica LTDA sob o nome comercial Opdivo® na forma farmacêutica de solução injetável para infusão intravenosa em frascos de 40 mg/4mL ou 100 mg/10mL. Em consulta à tabela da CMED no site da ANVISA em novembro de 2025 e com os dados de prescrição juntados ao processo, foi elaborada a tabela acima estimando o custo de um ano de tratamento.

Não encontramos estudos de custo-efetividade avaliando o tratamento do carcinoma de nasofaringe recorrente ou metastático com nivolumabe tanto para o cenário nacional quanto para o cenário internacional. Apresentamos abaixo as avaliações econômicas desse tratamento para carcinoma escamoso (epidermoide) de cabeça e pescoço.

No Brasil, o uso de nivolumabe para o tratamento de CECR recidivado ou metastático foi avaliado pela CONITEC em relatório publicado em agosto de 2024 (11). A análise de custo-efetividade para 5 anos comparou a intervenção com nivolumabe à quimioterapia padrão. O ganho de efetividade foi de 0,24 anos de vida ajustados pela qualidade (QALY) incrementais, porém a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) foi de R\$ 372.315,00, valor muito acima do limiar de R\$ 120.000 por QALY proposto pelo Ministério da Saúde. A intervenção não foi considerada custo-efetiva e a entidade deliberou pela não incorporação do nivolumabe para o tratamento desta doença.

Relatório técnico do Instituto Nacional de Saúde e Cuidados de Excelência (do inglês, National Institute for Health and Care Excellence ou NICE), do Reino Unido, avaliou o tratamento com nivolumabe para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço (16). O comitê foi favorável ao uso do nivolumabe em monoterapia em pacientes com progressão de doença dentro de 6 meses do tratamento prévio com quimioterapia condicionando sua incorporação ao sistema de saúde a acordo comercial para redução do preço de compra. O estudo de custo-efetividade indica um RCEI de \$ 294.400,00 por QALY, não sendo considerado uma tecnologia custo-efetiva (17).

Em conjunto, estudo de custo-efetividade realizado no Canadá estimou um RCEI de

\$144.744,00 por QALY ganho para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço com nivolumabe em monoterapia (18). A Canada's Drug Agency realizou parecer sobre o uso de nivolumabe em pacientes com CECR refratários à platina em 2017 (19). O comitê apresentou um parecer favorável a incorporação da medicação no sistema de saúde canadense contanto que realizada negociação do preço de compra para melhora no perfil de custo-efetividade.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Indeterminado já que não existem estudos de fase III. No entanto, espera-se com esse tratamento mediana de SLP foi de 2,4-2,8 meses e taxa de controle da doença foi de 45,8%.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não Recomendada

Conclusão

Tecnologia: NIVOLUMABE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Inicialmente, cabe contar que a avaliação de manutenção de tratamento já em uso configura uma decisão particularmente complexa. Apesar de avaliarmos o caso individual, entendemos que a conclusão da avaliação técnica deve alicerçar-se fundamentalmente na avaliação de benefícios a partir da literatura médica para pacientes de mesmo cenário clínico candidatos ao tratamento, tanto para questões de efetividade, custo-efetividade, e impacto orçamentário. Não existem estudos de fase III avaliando o tratamento do carcinoma de nasofaringe recorrente ou metastático com nivolumabe. Existe, no entanto, estudos de fase I e II que associaram tal tratamento a sobrevida livre de progressão que variaram de 2,4 a 2,8 meses e taxa de controle da doença foi de 45,8%. Trata-se, portanto, de tratamento paliativo sem intenções de cura. Em casos assim, é imprescindível a discussão do tamanho do benefício frente aos custos do tratamento.

Além desse benefício modesto, o tratamento pleiteado apresenta um provavelmente um perfil de custo-efetividade desfavorável, ou seja, o benefício ganho com a sua incorporação não ultrapassa o benefício perdido pelo deslocamento de outras intervenções em saúde que poderiam ser adquiridas com o mesmo investimento, perfazendo portanto mau uso dos recursos disponíveis ao sistema. No Brasil, o órgão público instituído para assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de novas tecnologias no SUS (CONITEC) não realizou avaliação do tratamento pleiteado para a condição em tela. Finalmente, o impacto orçamentário da terapia pleiteada, mesmo em decisão isolada, é elevado, com potencial de comprometimento de recursos públicos extraídos da coletividade - recursos públicos que são escassos e que possuem destinações orçamentárias com pouca margem de realocação, e cujo uso inadequado pode acarretar prejuízos a toda a população assistida pelo SUS.

Compreende-se o desejo do paciente e da equipe assistente de buscar tratamento para uma doença grave como a da situação clínica que se apresenta. No entanto, frente ao alto impacto orçamentário mesmo em decisão isolada, entendemos que se impõe o presente parecer desfavorável.

Sobre eventual efeito da interrupção do tratamento já instituído restam incertezas clínicas. Não há evidências sobre tais efeitos. Tampouco identificamos necessidade de suspensão gradual. O principal risco com a suspensão do tratamento é o de progressão da doença, risco este que também pode ocorrer na vigência do tratamento, não sendo possível garantir, para o caso específico e conforme os princípios da medicina baseada em evidências, que qualquer melhora clínica observada seja inequivocamente causada pelo tratamento.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: 1. Bergamasco VDB, Marta GN, Kowalski LP, Carvalho AL. Perfil epidemiológico do câncer de cabeça e pescoço no Estado de São Paulo. *Rev Bras Cir Cabeça Pescoço*. 2008;15–9.<https://www.cadth.ca/pembrolizumab-keytruda-hnscs-details>

2. Carvalho AL, Ikeda MK, Magrin J, Kowalski LP. Trends of oral and oropharyngeal cancer survival over five decades in 3267 patients treated in a single institution. *Oral Oncol*. janeiro de 2004;40(1):71–6.

3. Hashibe M, Hunt J, Wei M, Buys S, Gren L, Lee YCA. Tobacco, alcohol, body mass index, physical activity, and the risk of head and neck cancer in the prostate, lung, colorectal, and ovarian (PLCO) cohort. *Head Neck*. julho de 2013;35(7):914–22.

4. Hashibe M, Brennan P, Benhamou S, Castellsague X, Chen C, Curado MP, et al. Alcohol drinking in never users of tobacco, cigarette smoking in never drinkers, and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. *J Natl Cancer Inst*. 16 de maio de 2007;99(10):777–89.

5. Szymańska K, Hung RJ, Wünsch-Filho V, Eluf-Neto J, Curado MP, Koifman S, et al. Alcohol and tobacco, and the risk of cancers of the upper aerodigestive tract in Latin America: a case-control study. *Cancer Causes Control CCC*. julho de 2011;22(7):1037–46.

6. Ferreira Antunes JL, Toporcov TN, Biazzevic MGH, Boing AF, Scully C, Petti S. Joint and independent effects of alcohol drinking and tobacco smoking on oral cancer: a large case-control study. *PloS One*. 2013;8(7):e68132.

7. Instituto Nacional de Câncer/Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2020: Incidência de câncer no Brasil. [Internet]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios>

8. Ministério da Saúde. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas – Câncer de Cabeça e Pescoço [Internet]. 2015. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/DDT_CancerCabecaPescoco_2015.pdf

9. Furtado Mendonça Casati M, Altieri Vasconcelos J, Silva Vergnhanini G, Fernandez Contreiro P, Bedenko da Graça T, Ledo Kanda J, et al. Epidemiologia do câncer de cabeça e pescoço no Brasil: estudo transversal de base populacional. *Rev Bras Cir Cabeça Pescoço* [Internet]. 2012 [citado 25 de agosto de 2023]; Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-658429>

10. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practices Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): Head and Neck Cancers [Internet]. 2023 [citado 23 de agosto de 2023]. Disponível em: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/head-and-neck.pdf

11. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Nivolumabe Nº918 para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático após quimioterapia à base de platina (i.e., segunda linha de tratamento da doença recidivado ou metastática). Disponível em www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/relatorio-de-recomendacao-no-918-nivolumabe-cancer-cabeca-pescoco

12. Koppolu V, Rekha Vasigala VK. Checkpoint immunotherapy by nivolumab for treatment of metastatic melanoma. *J Cancer Res Ther*. 2018;14(6):1167–75.

13. Ma BBY, Lim WT, Goh BC, et al. Antitumor Activity of Nivolumab in Recurrent and Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: An International, Multicenter Study of the Mayo Clinic Phase 2 Consortium (NCI-9742). *J Clin Oncol*. 2018 May 10;36(14):1412-1418. doi:

10.1200/JCO.2017.77.0388. Epub 2018 Mar 27. Erratum in: J Clin Oncol. 2018 Aug 1;36(22):2360.

14. Delord JP, Hollebecque A, Boer JP, et al. An open-label, multicohort, phase I/II study to evaluate nivolumab in patients with virus-associated tumors (CheckMate 358): Efficacy and safety in recurrent or metastatic (R/M) nasopharyngeal carcinoma (NPC). J Clin Oncol 35, 6025(2017) Volume 35, Number 15_suppl

15. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, Guigay J, Colevas AD, Licitra L, Harrington K, Kasper S, Vokes EE, Even C, Worden F, Saba NF, Iglesias Docampo LC, Haddad R, Rordorf T, Kiyota N, Tahara M, Monga M, Lynch M, Geese WJ, Kopit J, Shaw JW, Gillison ML. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. N Engl J Med. 2016 Nov 10;375(19):1856-1867.

16. [National Institute for Health and Care Excellence](https://www.nice.org.uk/guidance/ta736). Nivolumab for treating recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck after platinum-based chemotherapy. Disponível em <https://www.nice.org.uk/guidance/ta736>

17. Tringale KR, Carroll KT, Zakeri K, Sacco AG, Barnachea L, Murphy JD. Cost-effectiveness Analysis of Nivolumab for Treatment of Platinum-Resistant Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. J Natl Cancer Inst. 2018 May 1;110(5):479-485.

18. Zargar M, McFarlane T, Chan KKW, Wong WWL. Cost-Effectiveness of Nivolumab in Recurrent Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Oncologist. 2018 Feb;23(2):225-233.

19. [Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health \(CADTH\)](https://www.cda-amc.ca/opdivo-squamous-cell-carcinoma-head-and-neck-scchn-details). Opdivo for Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck [\[Internet\]](https://www.cda-amc.ca/opdivo-squamous-cell-carcinoma-head-and-neck-scchn-details). Disponível em www.cda-amc.ca/opdivo-squamous-cell-carcinoma-head-and-neck-scchn-details

NatJus Responsável: RS - Rio Grande do Sul

Instituição Responsável: TelessaúdeRS

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: A parte autora apresenta documentos médicos (Evento 1, LAUDO8, Página 1 e Evento 18, EMAIL1, Página 1) informando possuir Câncer de Nasofaringe (CID10: C11), localmente avançado, diagnosticado em novembro de 2021. Apresenta padrão basaloide, com testagem para p16 e vírus Epstein Baar negativos. Realizou 4 ciclos de quimioterapia de indução com docetaxel, cisplatina e fluorouracil de 08/02/2022 a 19/04/2022, seguido de 4 ciclos de cisplatina e 25 frações de radioterapia, além do uso da capecitabina como adjuvante em agosto de 2022. Em junho de 2023 houve progressão da doença e foi reintroduzida quimioterapia sistêmica com cisplatina e gencitabina. Relata progressão local da doença em dezembro de 2023, momento em que foi submetida à cirurgia e mantido tratamento com capecitabina. Nova progressão local da doença oncológica observada em março de 2025 levou ao início do esquema de quimioterapia, com cisplatina e gencitabina. Em julho de 2025 foi reexposta a capecitabina, exibindo progressão da doença. Houve perda visual há 01 ano, por invasão local do tumor, evoluindo com perda auditiva. Nesse contexto, pleiteia tratamento paliativo com nivolumabe. Cabe ressaltar que a parte autora teve sua tutela antecipada em novembro de 2025 (Evento 20 - DESPADEC1).

O carcinoma da nasofaringe se enquadra no grupo de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (CECP), um conjunto de neoplasias malignas de diferentes localizações nesta área do corpo e se configura como uma das principais causas de morbidade e mortalidade por neoplasia maligna no Brasil, pois a maioria dos casos é diagnosticada em fases tardias [\(1,2\)](#). O tabagismo é o mais importante fator de risco para esse grupo de doenças, com risco atribuível

de 50% em estudos prospectivos longitudinais [\(3\)](#). Depois do tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas é o comportamento mais associado ao risco para CECP, quer em termos de quantidade quer em termos de duração. Importa notar que a magnitude do risco devido à interação entre o consumo de álcool e o tabagismo sugere efeito supra-aditivo, sendo os riscos maiores observados entre indivíduos com alto consumo simultâneo de álcool e de tabaco [\(4,5\)](#). Informações de Registros de Câncer de Base Populacional e de Registros Hospitalares de Câncer dão conta que o CECP no Brasil é mais comum entre homens, com idade entre 40 e 69 anos, tabagistas ou etilistas. No período de 2000 a 2008, os sítios de doença mais comuns foram a cavidade oral (46,9%), laringe (23,3%) e orofaringe (18,5%), com doença diagnosticada predominantemente em estágios avançados [\(6\)](#).

Trata-se de uma doença com prognóstico reservado, cuja sobrevida em cinco anos é estimada em 39% e 27% quando em estágios localmente avançado e metastático, respectivamente. Por definição, os pacientes com doença nos estágios avançados têm tumores maiores que 4 cm na maior dimensão, invasão de estruturas adjacentes e/ou evidência de envolvimento de linfonodos [\(7–9\)](#).

O tratamento do CECP é, preferencialmente, a ressecção cirúrgica. Conforme as Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, trata-se de uma doença pouco sensível à terapia antineoplásica sistêmica, o que limita a utilidade da quimioterapia paliativa na doença recidivada, com esquema terapêutico adequado à condição clínica, capacidade funcional e preferência do doente, podendo ser utilizada monoterapia (metotrexato, derivado de platina ou taxano) ou poliquimioterapia baseada em platina [\(8\)](#). A quimioterapia paliativa empregando dois ou mais medicamentos deve ser reservada aos pacientes sem limitação clínica para receber esquemas com derivados da platina com capacidade funcional preservada (ECOG 0 ou 1). Divulgada em 2021, diretriz internacional recomenda a casos de câncer de cabeça e pescoço, recidivante à quimioterapia paliativa de primeira e segunda linhas, cuidados de suporte exclusivo [\(10\)](#).